

Consejos generales



No consuma medicamentos por decisión propia. Consulte siempre a su médico o farmacéutico.



Tome la dosis que le indique su médico. No todas las personas necesitan la misma cantidad.



Recuerde que ingerir más de un medicamento puede facilitar la aparición de efectos adversos.




Tenga precaución al comenzar un tratamiento o al cambiar de dosis. El consumo de alcohol aumenta los efectos adversos.



Lea siempre el prospecto. Ante cualquier síntoma o anomalía, consulte a su médico o farmacéutico.

Nueva normativa




“Los medicamentos que afecten la capacidad para la conducción deberán llevar este símbolo  que alerta a los conductores de que lean atentamente el prospecto para extremar las precauciones al volante”

(Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre)



Los medicamentos viajan contigo



Conducir un vehículo o caminar pueden verse afectados por un consumo no responsable de medicamentos.



www.dgt.es


¿Conoce los efectos de su medicación

Glosario



Si está en tratamiento por...

... sobre la seguridad vial?



Ataxia y alteraciones de la coordinación:

Incapacidad del sistema nervioso de coordinar movimientos musculares para conducir o caminar.

Autoprescripción:

Consumir medicamentos sin prescripción médica y sin consejo farmacéutico.

Discinesia:

Incoordinación de movimientos voluntarios o aparición de movimientos involuntarios por efecto de una enfermedad o consumo de un medicamento.

Disminución de los reflejos y de la atención:

Lentitud en la respuesta del cuerpo a las necesidades de la conducción o de la vía.

Efecto de la edad:

Reducción o aumento descontrolado de la eficacia de los medicamentos debidos a la edad. Aparición e efectos perjudiciales por el consumo de varios medicamentos. Las dosis deben ser adaptadas a la edad del paciente.

Efectos anticolinérgicos:

Sequedad de boca, visión borrosa y delirio.

Hipoglucemia:

Descenso de la glucosa en sangre que origina mareo, sudor, temblor, dolor de cabeza, visión doble y que puede desencadenar convulsiones y pérdida de conciencia.

Interacción y medicamentos:

Alteración de los efectos de un fármaco por la administración de otro, por alimentos o por alcohol.

Mareo y vértigos:

Sensación de inestabilidad y movimiento del cuerpo, o de los objetos que nos rodean.

Polifarmacia:

Ingestión de varios medicamentos a la vez, que incrementa las posibilidades de efectos indeseables.

Sedación:

Reducción de la capacidad de atención y respuesta del organismo.

Temblor:

Movimientos involuntarios alternantes que afectan a cualquier parte del cuerpo, dificultando la conducción o la marcha.

Visión borrosa:

Incapacidad para enfocar imágenes en nuestra retina

* En algunos se desaconseja la conducción durante el tratamiento

** En algunos se desaconseja la conducción al comienzo del tratamiento o tras el cambio de dosis